Andermatt BioVet AG
6146 Grossdietwil
Tel. 062 917 51 10
www.biovet.ch info@biovet.ch

TAURRUS® (Raubmilben)

TAURRUS® spürt alle Stadien der roten Vogelmilbe (*Dermanyssus gallinae*) auf, sticht sie an und saugt sie aus. Diese Raubmilbenart zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus. Sie erträgt auch kühle Temperaturen im Winter. Ein weiterer Vorteil ist ihre hohe Toleranz gegenüber trockener Umgebung, so dass sich diese Raubmilbe sehr gut für das Klima in den Hühnerställen eignet. TAURRUS® ist vorbeugend sowie auch bei mässigem Befall einsetzbar.

Was sind TAURRUS®?

TAURRUS® sind Raubmilben, welche sich ausschliesslich von anderen Milben ernähren. Zu ihren Beutetieren gehört die rote Vogelmilbe. In allen Stadien ihres Lebens, von der Larve bis zum adulten Tier, leben TAURRUS® räuberisch. Sie bewegen sich langsam und sind sehr klein (bis 0,5 mm). Ihr Körper ist rhombisch geformt und sie besitzen dicke, lange Kiefertaster (siehe Bild unten). Sie bevorzugen trockene Zonen und haben eine lange Lebensdauer. Sie eignen sich zur ganzjährigen Kontrolle und Bekämpfung der roten Vogelmilbe in Geflügelställen. Nach der Aussetzung vermehren sich TAURRUS® entsprechend dem Vorkommen der roten Vogelmilbe, bis sich ein natürliches Gleichgewicht einstellt (Dauer 3 bis 4 Wochen). Wenn keine roten Vogelmilben mehr vorkommen, gehen die Raubmilben ein. TAURRUS® Raubmilben sind einheimisch und sicher für Geflügel und Mensch.

Wie werden TAURRUS® eingesetzt?

Raubmilben werden entsprechend der Befallsstärke durch die rote Vogelmilbe und pro Hühnereinheit dosiert. TAURRUS® sollte immer in Kombination mit ANDROLIS® ausgebracht weren. Die beiden Raubmilben müssen an unterschiedlichen Stellen eingesetzt werden. Beobachten Sie wo es im Stall am meisten rote Vogelmilben hat. Kontrollieren Sie Ecken und Nester, Ritzen und Unterseiten der Sitzstangen. Vogelmilben sitzen gerne in Rohren und in Metallprofilen. An den Orten mit der grössten Population an roten Vogelmilben bringen Sie das in der Versandpackung gelieferte Substrat, vor den Hühnern geschützt, häufchenweise aus. Mischen Sie das Substrat vor dem Ausbringen. Am einfachsten wird TAURRUS® vor dem Einstallen der Hühner ausgebracht. Dabei wird das Substrat auf dem trockenen Boden in der Nähe von Aufstiegsmöglichkeiten, in den Legenestern und auf der gesamten Volière (ausser Kotband) verteilt.

Dosierung:

M	für 10 Hühner
L	für 30 Hühner
XL	für 100 Hühner
PRO	für 1'000 Hühner

Bestelltermine:

Lieferfristen ca. 10–14 Arbeitstage

TAURRUS®
effektive Grösse bis 0,5 mm



Achtung:

Empfohlen sind mindestens 1–2 Ausbringungen im Abstand von 6–8 Wochen bei niedrigem Befall, bei hohem Befall in Abständen von 2 Wochen. TAURRUS® kehren in den ersten Tagen in die Häufchen zurück. Zusätzlich wachsen in den Häufchen aus Eiern neue Raubmilben heran. Bei sehr starkem Befall empfehlen wir Gallo-Sec in Kombination mit dem Bio-Phalanx Insektenspray einzusetzen. Nach dem Ablauf der Wartefristen dieser beiden Produkten können Raubmilben zur langfristigen und nachhaltigen Bekämpfung der roten Vogelmilbe ausgebracht werden.

Wichtig zu beachten:

- Raubmilben reagieren empfindlich auf milbenwirksame Mittel wie Akarizide oder Silikate wie Gallo-Sec. Aus diesem Grund sollten Sie die Raubmilben erst ausbringen, wenn keine Ablagerungen mehr von Silikatstäuben vorhanden sind. Auch die Wartefristen von Akariziden sind unbedingt einzuhalten.
- Raubmilben passen sich schnell an die Umgebungbedingungen im Geflügelstall an, mögen aber keine offenen Wasserflächen (z.B. Waschen des Stalles). Es ist somit wichtig, sie nicht in nassen Bereichen auszusetzen.
- Haltbarkeit: Nützlinge nach Erhalt sofort ausbringen.
- Milben nicht unter 4 °C lagern.